

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра высшей математики

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА

*Методические указания и варианты
заданий по разделам:*

**Функции нескольких переменных,
Интегральное исчисление,
Дифференциальные уравнения,
Числовые и функциональные ряды**

Брест 2013

УДК 51(075.8)

В учебно-методической разработке предложены задания по разделам: «Функции нескольких переменных», «Интегральное исчисление», «Дифференциальные уравнения», «Числовые и функциональные ряды» курса «Высшая математика». Приведены подробные решения типовых задач, даны некоторые методические рекомендации, полезные для успешного выполнения заданий. Может быть использовано для студентов дневной, заочной и вечерней форм обучения.

Составители: Гладкий И.И., доцент,
Жук А.И., ассистент,
Махнист Л.П., к.т.н., доцент,
Осопрелко Т.Н., старший преподаватель,
Юхимук Т.Ю., ассистент

Рецензент: Мирская Е.И., доцент кафедры математического моделирования учреждения образования «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина», к.ф.-м.н., доцент.

**I Практические задания по теме:
«Функции нескольких переменных»**

№1. Найти частные производные второго порядка функции.

1) $z(x, y) = 3x^3 y^2 + 2x^2 y - 4xy^3 + 5x - 15y^2 + 3$.

2) $z(x, y) = 4y^3 x^2 - 5y^2 x + 3yx^3 + 3y - 5x^2 + 7$.

3) $z(x, y) = 2x^3 y^2 - 2x^3 y - 4xy^3 + 5x - 2y^3 + 7$.

4) $z(x, y) = 7y^3 x^2 + 3y^2 x - yx^3 + 3y^2 - 5x^2 + 1$.

5) $z(x, y) = 5x^3 y^2 - 3x^2 y + 2xy^3 - 4x + 8y^2 - 4$.

6) $z(x, y) = 2y^3 x^2 - 4y^2 x + 3yx^3 - 5y + 7x^2 - 6$.

7) $z(x, y) = 3x^2 y^3 - 5x^2 y + 2xy^3 + y - 4x + 7y^2 - 11$.

8) $z(x, y) = 3y^3 x^2 + 5y^2 x + 2yx^3 - 7y^2 + 2x - 12$.

9) $z(x, y) = 7x^3 y^2 - 4x^2 y - 7xy^3 + 2y^2 - 2x - 5$.

10) $z(x, y) = 2x^3 y^2 - 3xy + 2xy^3 - 4x^2 + 4y - 5$.

№2. Найти полный дифференциал функции.

1) $z(x, y) = \arccos^3 \sqrt{\frac{y}{x}}$.

6) $z(x, y) = \arcsin^5 \sqrt{\frac{y}{x}}$.

2) $z(x, y) = \operatorname{arctg}^6 \sqrt{\frac{x}{y}}$.

7) $z(x, y) = \operatorname{arcctg}^4 \sqrt{\frac{x}{y}}$.

3) $z(x, y) = \sin^3 \frac{\sqrt{y}}{x^4}$.

8) $z(x, y) = \cos^5 \frac{\sqrt{x}}{y^3}$.

4) $z(x, y) = \operatorname{ctg}^4 \frac{y^5}{\sqrt{x}}$.

9) $z(x, y) = \operatorname{tg}^3 \frac{x^4}{\sqrt{y}}$.

5) $z(x, y) = \cos^2 \left(\frac{x^2}{y} \right)$.

10) $z(x, y) = \sin^3 \left(\frac{x}{y^2} \right)$.

№3. С помощью дифференциала приближённо вычислить выражение с точностью до трёх знаков после запятой.

1) $\sqrt{3,12^2 + 3,98^2}$.

6) $\sqrt{5,86^2 + 8,11^2}$.

2) $\sqrt{5,19^2 + 11,97^2}$.

7) $\sqrt{3,03^2 + 3,87^2}$.

3) $\sqrt{6,12^2 + 7,98^2}$.

8) $\sqrt{5,13^2 + 11,91^2}$.

4) $\sqrt{2,86^2 + 4,11^2}$.

9) $\sqrt{5,93^2 + 8,21^2}$.

5) $\sqrt{4,91^2 + 12,07^2}$.

10) $\sqrt{2,93^2 + 4,21^2}$.

№4. Вычислить производную функции $z(x, y)$ в точке M в направлении вектора \vec{a} .

1) $z(x, y) = 3x^3 - 3y^2 x + 3yx^2 - 1$,

$M(1; -2), \quad \vec{a} = (3; -4)$.

2) $z(x, y) = 3x^3 + 4y^2 x + 6yx^2 - 3$,

$M(2; -1), \quad \vec{a} = (-6; -8)$.

3) $z(x, y) = 2x^3 - 3y^2 x - 2xy + 3x^2 + 2y + 4$,

$M(2; -1), \quad \vec{a} = (-4; -3)$.

- 4) $z(x,y) = x^3 - 2y^2x + xy + 3y^2 - x - 3y + 3$, $M(-1;3)$, $\bar{a} = (12;-5)$.
 5) $z(x,y) = x^2 + xy + y^2 + 2x + 2y$, $M(1;1)$, $\bar{a} = (3;4)$.
 6) $z(x,y) = 2y^3 - 2x^2y + 2xy^2 - 5$, $M(-2;1)$, $\bar{a} = (-4;3)$.
 7) $z(x,y) = -3y^3 - 4x^2y - 6xy^2 + 5$, $M(-1;2)$, $\bar{a} = (-8;-6)$.
 8) $z(x,y) = 2y^3 - 3x^2y - 2xy + 3y^2 + 2x + 15$, $M(-1;2)$, $\bar{a} = (-3;4)$.
 9) $z(x,y) = y^3 - 2x^2y + xy + 3x^2 - 3x - y + 5$, $M(3;-1)$, $\bar{a} = (-5;-12)$.
 10) $z(x,y) = y^3 + 3xy^2 - 2x^2 + 4x + 10y + 3$, $M(-1;2)$, $\bar{a} = (4;-3)$.

№5. Исследовать на экстремум функцию.

- 1) $z(x,y) = 2x^3 + 12xy + 3y^2 - 6x - 12y + 13$.
 2) $z(x,y) = -3x^2 - 12xy - 2y^3 + 12x + 6y - 10$.
 3) $z(x,y) = 2x^3 - 6xy - 3y^2 - 6x + 6y + 1$.
 4) $z(x,y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2 - 12y + 5$.
 5) $z(x,y) = 2x^3 + 6xy - 3y^2 - 12x + 1$.
 6) $z(x,y) = 2x^3 - 12xy + 3y^2 + 30x - 6y + 6$.
 7) $z(x,y) = -3x^2 + 12xy - 2y^3 + 6x - 30y + 1$.
 8) $z(x,y) = 2y^3 - 6xy - 3x^2 - 6y + 6x + 10$.
 9) $z(x,y) = -3x^2 + 6xy - 2y^3 + 12x + 2$.
 10) $z(x,y) = 2x^3 + 6xy - 3y^2 - 36x + 2$.

№6. Используя метод наименьших квадратов, найти линейную зависимость между x и y по данным, приведенным в таблице. Сделать чертеж.

	i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	x_i	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
	y_i	-9	-7	-2	-1	3	-3	9	11	15	19
2)	x_i	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
	y_i	-9	-8	-4	-4	-1	-8	3	4	7	10
3)	x_i	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
	y_i	-15	-13	-8	-7	-3	-9	3	5	9	13
4)	x_i	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
	y_i	-4	-3	1	1	4	-3	8	9	12	15
5)	x_i	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	y_i	-3	-2	2	2	5	-2	9	10	13	16
6)	x_i	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
	y_i	-9	-7	-2	-1	3	-3	9	11	15	19

7)	x_i	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
	y_i	-6	-4	1	2	6	0	12	14	18	22
8)	x_i	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
	y_i	-4	-4	-1	-2	0	-8	2	2	4	6
9)	x_i	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
	y_i	-4	-3	1	1	4	-3	8	9	12	15
10)	x_i	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	y_i	-4	-3	1	1	4	-3	8	9	12	15

II Практические задания по теме: «Интегральное исчисление»

№1. Найти неопределенные интегралы:

а)

1. $\int \frac{dx}{\sin^2(3x-4)}$

6. $\int \frac{dx}{\cos^2(2x-3)}$

2. $\int \sin(2-5x)dx$

7. $\int \cos(3-4x)dx$

3. $\int e^{7-5x}dx$

8. $\int e^{-2x+5}dx$

4. $\int \frac{dx}{2-7x}$

9. $\int \frac{dx}{5-3x}$

5. $\int 2^{3-4x}dx$

10. $\int 3^{-5x+2}dx$

б)

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{25+9x^2}}$

6. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-25}}$

2. $\int \frac{dx}{16x^2+9}$

7. $\int \frac{dx}{49x^2+25}$

3. $\int \frac{dx}{\sqrt{25-4x^2}}$

8. $\int \frac{dx}{\sqrt{16-9x^2}}$

4. $\int \frac{dx}{16-25x^2}$

9. $\int \frac{dx}{36x^2-25}$

5. $\int \frac{dx}{\sqrt{9-25x^2}}$

10. $\int \frac{dx}{\sqrt{9x^2-16}}$

В)

1. $\int \frac{x}{2x^2 - 1} dx.$
2. $\int \frac{x}{\sqrt{2x^2 + 9}} dx.$
3. $\int \frac{x}{3x^2 - 2} dx.$
4. $\int \frac{x}{\sqrt{4x^2 - 3}} dx.$
5. $\int \frac{x}{3x^2 - 5} dx.$
6. $\int \frac{x}{\sqrt{3x^2 + 1}} dx.$
7. $\int \frac{x}{5x^2 - 3} dx.$
8. $\int \frac{x}{\sqrt{5x^2 + 2}} dx.$
9. $\int \frac{x}{3x^2 + 4} dx.$
10. $\int \frac{x}{\sqrt{2x^2 - 1}} dx.$

Г)

1. $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x} - 3}} dx.$
2. $\int \frac{\sqrt{\ln(5x - 3)}}{5x - 3} dx.$
3. $\int \operatorname{tg}(5x + 3) dx.$
4. $\int \operatorname{ctg}(3x + 7) dx.$
5. $\int \frac{\sqrt{\operatorname{tg}5x}}{\cos^2 5x} dx.$
6. $\int \frac{\sqrt{\operatorname{ctg}5x}}{\sin^2 5x} dx.$
7. $\int \frac{\sqrt{\operatorname{arcsin}3x}}{\sqrt{1 - 9x^2}} dx.$
8. $\int \frac{\sqrt{\operatorname{arcctg}5x}}{1 + 25x^2} dx.$
9. $\int \frac{\sqrt{\operatorname{arccos}2x}}{\sqrt{1 - 4x^2}} dx.$
10. $\int \frac{\sqrt{\operatorname{arctg}4x}}{1 + 16x^2} dx.$

№2. Найти неопределенный интеграл:

1. $\int \frac{x}{\sqrt{5x - 2}} dx.$
2. $\int \frac{x}{\sqrt{3x + 5}} dx.$
3. $\int \frac{x}{\sqrt{2x - 6}} dx.$
4. $\int \frac{x}{\sqrt{4x + 3}} dx.$
5. $\int \frac{x}{\sqrt{6x - 4}} dx.$
6. $\int x\sqrt{2x + 5} dx.$
7. $\int x\sqrt{4x - 6} dx.$
8. $\int x\sqrt{5x + 2} dx.$
9. $\int x\sqrt{6x - 3} dx.$
10. $\int x\sqrt{3x + 4} dx.$

№3. Найти неопределенный интеграл:

1. $\int \arcsin 5x dx.$

2. $\int \arctg 4x dx.$

3. $\int x \cdot \sin 5x dx.$

4. $\int x \cdot e^{-2x} dx.$

5. $\int (3x^2 - 4x + 2) \ln x dx.$

6. $\int \operatorname{arcctg} 2x dx.$

7. $\int \arccos 3x dx.$

8. $\int x \cdot \cos 3x dx.$

9. $\int x \cdot e^{-4x} dx.$

10. $\int (5 + 2x - 6x^2) \ln x dx.$

№4. Найти неопределенный интеграл:

1. $\int \frac{6x - 1}{x^2 + 4x + 8} dx.$

2. $\int \frac{3x - 1}{x^2 + 8x + 25} dx.$

3. $\int \frac{3x - 1}{x^2 + 2x + 5} dx.$

4. $\int \frac{4x - 3}{x^2 + 6x + 13} dx.$

5. $\int \frac{2x + 5}{x^2 + 10x + 29} dx.$

6. $\int \frac{6x + 5}{x^2 - 4x + 20} dx.$

7. $\int \frac{2x - 3}{x^2 - 8x + 20} dx.$

8. $\int \frac{2x + 3}{x^2 - 2x + 10} dx.$

9. $\int \frac{4x + 5}{x^2 - 6x + 18} dx.$

10. $\int \frac{2x + 1}{x^2 - 10x + 34} dx.$

№5. Найти неопределенный интеграл:

1. $\int \frac{3x^2 + 20x + 9}{(x + 3)(x + 1)(x + 5)} dx.$

2. $\int \frac{43x - 67}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} dx.$

3. $\int \frac{8x}{(x + 5)(x + 1)(x + 3)} dx.$

4. $\int \frac{6x^2 + 6x - 6}{(x + 2)(x + 1)(x - 1)} dx.$

5. $\int \frac{3x^2 - 15}{(x + 2)(x - 1)(x + 3)} dx.$

6. $\int \frac{4x^2 + 32x + 52}{(x + 5)(x + 1)(x + 3)} dx.$

7. $\int \frac{6x^2}{(x + 1)(x - 1)(x + 2)} dx.$

8. $\int \frac{2x^2 - 26}{(x + 5)(x + 1)(x + 3)} dx.$

9. $\int \frac{6x^2}{(x + 2)(x + 1)(x - 1)} dx.$

10. $\int \frac{7x^2 - 17x}{(x - 2)(x + 1)(x - 3)} dx.$

№6. Найти площадь фигуры, ограниченной параболой и прямой

1. $f(x) = -x^2 - 4x + 7,$

2. $g(x) = x^2 + 4x - 4,$

3. $f(x) = -x^2 - 2x + 1,$

4. $g(x) = x^2 + 4x + 1,$

5. $f(x) = -x^2 + 4x - 4,$

$g(x) = -2x + 4.$

$f(x) = 2x - 1.$

$g(x) = -3x - 1.$

$f(x) = 3x + 3.$

$g(x) = 2x - 7.$

- | | | |
|-----|--------------------------|-------------------|
| 6. | $g(x) = x^2 - 4x + 2,$ | $f(x) = -2x + 5.$ |
| 7. | $f(x) = -x^2 + 2x + 5,$ | $g(x) = 3x + 3.$ |
| 8. | $g(x) = x^2 + 2x + 2,$ | $f(x) = 3x + 4.$ |
| 9. | $f(x) = -x^2 - 8x - 11,$ | $g(x) = -4x - 8.$ |
| 10. | $g(x) = x^2 + 8x + 12,$ | $f(x) = 2x + 7.$ |

**III Практические задания по теме:
«Дифференциальные уравнения»**

№1. Найти общее решение дифференциального уравнения:

а)

- | | | | |
|----|--|-----|---|
| 1. | $\operatorname{tg} x \, dy - y \, dx = 0.$ | 6. | $\operatorname{ctg} x \, dy + y \, dx = 0.$ |
| 2. | $\sqrt{16 + x^2} \, dy - y \, dx = 0.$ | 7. | $\sqrt{x^2 - 25} \, dy - y \, dx = 0.$ |
| 3. | $x^2 \, dy + y \, dx = 0.$ | 8. | $(x^2 - 9) \, dy - y \, dx = 0.$ |
| 4. | $(e^x + 2) \, dy - y e^x \, dx = 0.$ | 9. | $(e^x - 3) \, dy - y e^x \, dx = 0.$ |
| 5. | $(4 + x^2) \, dy - y \, dx = 0.$ | 10. | $\sqrt{16 - x^2} \, dy - y \, dx = 0.$ |

б)

- | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | $(x^2 + 3) y' - 2yx = 0.$ | 6. | $(x^2 - 4) y' - 2yx = 0.$ |
| 2. | $\cos^2 x \cdot y' - y = 0.$ | 7. | $\sin^2 x \cdot y' + y = 0.$ |
| 3. | $(5x + 2) \cdot y' - (5x + 7)y = 0.$ | 8. | $(3x + 4) y' - y(3x + 7) = 0.$ |
| 4. | $\sqrt{1 + x^2} \cdot y' - xy = 0.$ | 9. | $\sqrt{x^2 + 4} \cdot y' - xy = 0.$ |
| 5. | $(1 + x^3) y' - 3x^2 y = 0.$ | 10. | $(1 + x^4) y' - 4x^3 y = 0.$ |

№2. Найти частное решение дифференциального уравнения:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | $y' - \frac{2}{x} y = 3e^{3x-6} x^2,$ | $y(2) = 8.$ |
| 2. | $y' - \frac{5}{x} y = 3e^{3x+6} x^5,$ | $y(-2) = 32.$ |
| 3. | $y' + \frac{2}{x} y = \frac{3e^{3x+6}}{x^2},$ | $y(-2) = 1.$ |
| 4. | $y' - \frac{2}{x} y = 3x^2 \cos(3x - 6),$ | $y(2) = 16.$ |
| 5. | $y' - \frac{5}{x} y = 6x^5 \sin(6x + 6).$ | $y(-1) = 2.$ |
| 6. | $y' - \frac{3}{x} y = 2e^{2x-6} x^3,$ | $y(3) = 54.$ |

$$7. \quad y' - \frac{4}{x}y = 2e^{2x+4}x^4, \quad y(-2) = 32.$$

$$8. \quad y' + \frac{3}{x}y = \frac{2e^{2x+4}}{x^3}, \quad y(-1) = 2.$$

$$9. \quad y' - \frac{3}{x}y = 2x^3 \cos(2x - 6), \quad y(3) = 54.$$

$$10. \quad y' - \frac{4}{x}y = 2x^4 \sin(2x - 4), \quad y(2) = 32.$$

№3. Найти общее решение дифференциального уравнения:

1. а) $y'' + 4y' - 12y = 0$, б) $y'' - 4y' + 4y = 0$, в) $y'' + 6y' + 13y = 0$.
2. а) $y'' - 2y' - 15y = 0$, б) $y'' + 8y' + 16y = 0$, в) $y'' - 10y' + 29y = 0$.
3. а) $y'' + 2y' - 8y = 0$, б) $y'' - 14y' + 49y = 0$, в) $y'' + 6y' + 34y = 0$.
4. а) $y'' - 3y' - 10y = 0$, б) $y'' + 10y' + 25y = 0$, в) $y'' - 8y' + 25y = 0$.
5. а) $y'' + 6y' - 16y = 0$, б) $y'' - 6y' + 9y = 0$, в) $y'' + 4y' + 20y = 0$.
6. а) $y'' - 5y' - 14y = 0$, б) $y'' + 22y' + 121y = 0$, в) $y'' - 8y' + 41y = 0$.
7. а) $y'' + y' - 12y = 0$, б) $y'' - 18y' + 81y = 0$, в) $y'' + 4y' + 40y = 0$.
8. а) $y'' - y' - 20y = 0$, б) $y'' + 12y' + 36y = 0$, в) $y'' - 14y' + 53y = 0$.
9. а) $y'' + 4y' - 21y = 0$, б) $y'' - 20y' + 100y = 0$, в) $y'' + 8y' + 20y = 0$.
10. а) $y'' - 3y' - 18y = 0$, б) $y'' + 16y' + 64y = 0$, в) $y'' - 10y' + 34y = 0$.

№4. Найти общее решение дифференциального уравнения:

1. $y'' + 2y' - 8y = -16x^2 + 16x - 22$.
2. $y'' - y' - 6y = -24x^2 - 2x - 9$.
3. $y'' - 4y' - 5y = -15x^2 + 6x + 10$.
4. $y'' - 6y' - 7y = -14x^2 + 4x + 7$.
5. $y'' + y' - 6y = -24x^2 - 4x + 16$.
6. $y'' + y' - 12y = -24x^2 + 40x - 11$.
7. $y'' - 3y' - 10y = -40x^2 - 4x + 4$.
8. $y'' + 7y' - 8y = -32x^2 + 16x + 35$.
9. $y'' + 4y' - 5y = -25x^2 - 5x + 6$.
10. $y'' - 2y' - 15y = -30x^2 + 7x - 9$.

№5. Найти общее решение дифференциального уравнения:

1. $y'' + 2y' - 15y = 16e^{3x}$.
2. $y'' + 6y' + 9y = 8e^{-3x}$.
3. $y'' - 4y' - 12y = 24e^{-2x}$.
4. $y'' - 10y' + 25y = 10e^{5x}$.
5. $y'' - 2y' - 15y = 24e^{5x}$.
6. $y'' + 4y' + 4y = 6e^{-2x}$.
7. $y'' - 2y' - 8y = 18e^{4x}$.
8. $y'' - 8y' + 16y = 6e^{4x}$.
9. $y'' + 3y' - 10y = 14e^{2x}$.
10. $y'' - 6y' + 9y = 10e^{3x}$.

№6. Найти общее решение системы дифференциальных уравнений:

1. $\begin{cases} x' = 2x + y, \\ y' = 3x + 4y. \end{cases}$
2. $\begin{cases} x' = 4x - 8y, \\ y' = -8x + 4y. \end{cases}$
6. $\begin{cases} x' = 3x + y, \\ y' = x + 3y. \end{cases}$
7. $\begin{cases} x' = 4x + 2y, \\ y' = 4x + 6y. \end{cases}$

$$3. \begin{cases} x' = 3x + y, \\ y' = 8x + y. \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x' = 4x - y, \\ y' = -x + 4y. \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} x' = x + 2y, \\ y' = 4x + 3y. \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} x' = 2x + y, \\ y' = -6x - 3y. \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} x' = 6x - y, \\ y' = 3x + 2y. \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} x' = -2x + y, \\ y' = -3x + 2y. \end{cases}$$

IV Практические задания по теме: «Числовые и функциональные ряды»

№1. Исследовать сходимость ряда:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^3+n+6}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^2+4n+3}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^3+3n+5}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2+2n+4}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^3+4n+2}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+2n+4}{n^3+5n+1}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^3+n+5}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^3+3n^2+2}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+5}{n^3+n+5}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+2n+11}{n^3+3n^2+1}$$

№2. Исследовать сходимость ряда:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3) \cdot 10^n}{3^{2n-4}}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+7) \cdot 15^n}{2^{4n+1}}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3) \cdot 17^{n+2}}{4^{2n-3}}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+4) \cdot 5^{2n+1}}{3^{3n-4}}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+4) \cdot 3^{4n-1}}{4^{3n+2}}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+4) \cdot 7^n}{2^{3n-2}}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+5) \cdot 3^{2n+4}}{2^{3n}}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3) \cdot 8^n}{3^{2n-3}}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2) \cdot 2^{2n+1}}{3^n}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3) \cdot 11^{2n-2}}{2^{7n+1}}$$

№3. Исследовать сходимость ряда:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^{3n+1} (n+3)^{n^2}}{14^{3n-2} \cdot n^{n^2}}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^{2n+3} (n+2)^{n^2}}{19^{2n-1} \cdot n^{n^2}}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{4n+3} (n+4)^{n^2}}{10^{4n-2} \cdot n^{n^2}}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^{2n+1} (n+2)^{n^2}}{13^{2n-3} \cdot n^{n^2}}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^{5n+2} (n+5)^{n^2}}{11^{5n-3} \cdot n^{n^2}}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^{4n+2} (n+4)^{n^2}}{27^{4n-1} \cdot n^{n^2}}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6^{3n+1} (n+3)^{n^2}}{17^{3n-2} \cdot n^{n^2}}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{2n+1} (n+2)^{n^2}}{8^{2n-1} \cdot n^{n^2}}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^{5n+2} (n+5)^{n^2}}{20^{5n-1} \cdot n^{n^2}}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8^{3n+1} (n+3)^{n^2}}{21^{3n-2} \cdot n^{n^2}}$$

№4. Исследовать сходимость ряда:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n+1}{n^2 + 2n + 73}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n+2}{n^2 + 4n + 94}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n+1}{n^2 + 2n + 57}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n+2}{n^2 + 4n + 114}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n+1}{n^2 + 2n + 241}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n+3}{n^2 + 6n + 99}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n+2}{n^2 + 4n + 136}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n+2}{n^2 + 4n + 114}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n+1}{n^2 + 2n + 157}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n+2}{n^2 + 4n + 186}$$

№5. Найти область сходимости степенного ряда:

$$1. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{4^n (n+2)}$$

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{5^n (n+3)}$$

$$3. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n (n+4)}$$

$$4. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n (n+1)}$$

$$6. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{7^n (n+4)}$$

$$7. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{11^n (n+9)}$$

$$8. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{9^n (n+10)}$$

$$9. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{12^n (n+7)}$$

$$5. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{10^n(n+8)}.$$

$$10. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{8^n(n+3)}.$$

№6. Найти разложение в степенной ряд по степеням x решения дифференциального уравнения (записать три первых, отличных от нуля, члена этого разложения):

$$1. \quad y' = xy + e^y, \quad y(0) = 0.$$

$$6. \quad y' = e^x + y^2x, \quad y(0) = 1.$$

$$2. \quad y' = x^2y^2 + 1, \quad y(0) = 1.$$

$$7. \quad y' = x^2 + 2y^2, \quad y(0) = 3.$$

$$3. \quad y' = x^2 - y^2, \quad y(0) = 2.$$

$$8. \quad y' = x^2 + xy + y^2, \quad y(0) = 2.$$

$$4. \quad y' = x + x^2 + 2y^2, \quad y(0) = 1.$$

$$9. \quad y' = 2x + y^2 + e^x, \quad y(0) = 1.$$

$$5. \quad y' = 2x^2 - 2yx, \quad y(0) = 4.$$

$$10. \quad y' = ye^x, \quad y(0) = 1.$$

V Решение практических заданий по теме: «Функции нескольких переменных»

№1. Найти частные производные второго порядка функции

$$z(x, y) = 4y^3x^2 - 6y^2x + 7yx^3 - 2y + 3x^2 - 5.$$

Решение

Вычислим частные производные первого порядка функции $z(x, y)$:

$$\begin{aligned} z'_x &= (4y^3x^2 - 6y^2x + 7yx^3 - 2y + 3x^2 - 5)'_x = \\ &= 4y^3(x^2)'_x - 6y^2(x)'_x + 7y(x^3)'_x - 0 + 3(x^2)'_x - 0 = 8y^3x - 6y^2 + 21yx^2 + 6x; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z'_y &= (4y^3x^2 - 6y^2x + 7yx^3 - 2y + 3x^2 - 5)'_y = \\ &= 4(y^3)'_y x^2 - 6(y^2)'_y x + 7(y)'_y x^3 - 2(y)'_y + 0 - 0 = 12y^2x^2 - 12yx + 7x^3 - 2. \end{aligned}$$

Найдем частные производные второго порядка:

$$\begin{aligned} z''_{xx} &= (z'_x)'_x = (8y^3x - 6y^2 + 21yx^2 + 6x)'_x = 8y^3(x)'_x - 0 + 21y(x^2)'_x + 6(x)'_x = \\ &= 8y^3 + 42yx + 6; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z''_{xy} &= (z'_x)'_y = (8y^3x - 6y^2 + 21yx^2 + 6x)'_y = 8(y^3)'_y x - 6(y^2)'_y + 21(y)'_y x^2 + 0 = \\ &= 24y^2x - 12y + 21x^2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z''_{yx} &= (z'_y)'_x = (12y^2x^2 - 12yx + 7x^3 - 2)'_x = 12y^2(x^2)'_x - 12y(x)'_x + 7(x^3)'_x - 0 = \\ &= 24y^2x - 12y + 21x^2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z''_{yy} &= (z'_y)'_y = (12y^2x^2 - 12yx + 7x^3 - 2)'_y = 12(y^2)'_y x^2 - 12(y)'_y x + 0 - 0 = \\ &= 24yx^2 - 12x. \end{aligned}$$

Заметим, что для смешанных частных производных функции второго порядка z''_{xy} , z''_{yx} выполняется соотношение $z''_{xy} = z''_{yx}$.

№2. Найти полный дифференциал функции

$$z(x, y) = \operatorname{tg}^5 \sqrt{\frac{y}{x}}.$$

Решение

Вычисляя частные производные первого порядка функции $z(x, y)$, получим:

$$\begin{aligned} z'_x &= \left(\operatorname{tg}^5 \sqrt{\frac{y}{x}} \right)'_x = 5 \operatorname{tg}^4 \sqrt{\frac{y}{x}} \cdot \left(\operatorname{tg} \sqrt{\frac{y}{x}} \right)'_x = 5 \operatorname{tg}^4 \sqrt{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \sqrt{\frac{y}{x}}} \cdot \left(\sqrt{\frac{y}{x}} \right)'_x = \\ &= 5 \operatorname{tg}^4 \sqrt{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \sqrt{\frac{y}{x}}} \cdot \sqrt{y} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)'_x = 5 \operatorname{tg}^4 \sqrt{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \sqrt{\frac{y}{x}}} \cdot \sqrt{y} \cdot \left(-\frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}} \right) = \\ &= -5 \operatorname{tg}^4 \sqrt{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \sqrt{\frac{y}{x}}} \cdot \frac{\sqrt{y}}{2x\sqrt{x}}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z'_y &= \left(\operatorname{tg}^5 \sqrt{\frac{y}{x}} \right)'_y = 5 \operatorname{tg}^4 \sqrt{\frac{y}{x}} \cdot \left(\operatorname{tg} \sqrt{\frac{y}{x}} \right)'_y = 5 \operatorname{tg}^4 \sqrt{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \sqrt{\frac{y}{x}}} \cdot \left(\sqrt{\frac{y}{x}} \right)'_y = \\ &= 5 \operatorname{tg}^4 \sqrt{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \sqrt{\frac{y}{x}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \left(\sqrt{y} \right)'_y = 5 \operatorname{tg}^4 \sqrt{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \sqrt{\frac{y}{x}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \left(\frac{1}{2} y^{-\frac{1}{2}} \right) = \\ &= 5 \operatorname{tg}^4 \sqrt{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \sqrt{\frac{y}{x}}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{xy}}. \end{aligned}$$

Тогда полный дифференциал функции равен

$$dz = z'_x dx + z'_y dy = -5 \operatorname{tg}^4 \sqrt{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \sqrt{\frac{y}{x}}} \cdot \frac{\sqrt{y}}{2x\sqrt{x}} dx + 5 \operatorname{tg}^4 \sqrt{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \sqrt{\frac{y}{x}}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{xy}} dy.$$

Ответ: $dz = -5 \operatorname{tg}^4 \sqrt{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \sqrt{\frac{y}{x}}} \cdot \frac{\sqrt{y}}{2x\sqrt{x}} dx + 5 \operatorname{tg}^4 \sqrt{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \sqrt{\frac{y}{x}}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{xy}} dy.$

№3. С помощью дифференциала вычислить приближённо выражение $\sqrt{4,11^2 + 3,02^2}$ с точностью до трёх знаков после запятой.

Решение

Представим данную величину в виде

$$\sqrt{4,11^2 + 3,02^2} = \sqrt{(4 + 0,11)^2 + (3 + 0,02)^2}$$

и введём функцию $f(x; y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, где $x = x_0 + \Delta x$; $x_0 = 4$; $\Delta x = 0,11$; $y = y_0 + \Delta y$; $y_0 = 3$; $\Delta y = 0,02$.

Воспользуемся формулой

$$f(x; y) \approx f(x_0; y_0) + f'_x(x_0; y_0) \cdot \Delta x + f'_y(x_0; y_0) \cdot \Delta y.$$

Получим:

$$f(x_0; y_0) = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5, \quad f'_x(x; y) = \left(\sqrt{x^2 + y^2} \right)' = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$f'_x(x_0; y_0) = \frac{3}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{3}{5},$$

$$f'_y(x; y) = \left(\sqrt{x^2 + y^2} \right)' = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$f'_y(x_0; y_0) = \frac{4}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{4}{5}.$$

Вычисляем:

$$\sqrt{4,11^2 + 3,02^2} \approx 5 + 0,6 \cdot 0,11 + 0,8 \cdot 0,02 = 5 + 0,066 + 0,016 = 5,082.$$

Ответ: 5,082.

№4. Вычислить производную функции

$$z(x, y) = y^3 + x^2y - xy^2 - 5x - 4y$$

в точке $M(-1; 2)$ в направлении вектора $\vec{a} = (12; -5)$.

Решение

Вычислим частные производные первого порядка функции $z(x, y)$:

$$z'_x = (y^3 + x^2y - xy^2 - 5x - 4y)'_x = 0 + (x^2)'_x y - (x)'_x y^2 - 5(x)'_x - 0 = 2xy - y^2 - 5;$$

$$z'_y = (y^3 + x^2y - xy^2 - 5x - 4y)'_y = (y^3)'_y + x^2(y)'_y - x(y^2)'_y - 0 - 4(y)'_y = \\ = 3y^2 + x^2 - 2xy - 4.$$

Найдем значения частных производных первого порядка функции в точке $M(-1; 2)$:

$$z'_x \Big|_{(-1; 2)} = (2xy - y^2 - 5) \Big|_{(-1; 2)} = 2 \cdot (-1) \cdot 2 - 2^2 - 5 = -13;$$

$$z'_y \Big|_{(-1; 2)} = (3y^2 + x^2 - 2xy - 4) \Big|_{(-1; 2)} = 3 \cdot 2^2 + (-1)^2 - 2 \cdot (-1) \cdot 2 - 4 = 13$$

Вычислим координаты вектора \vec{e} , длина которого равна 1, коллинеарного вектору \vec{a} :

$$\vec{e} = (e_x; e_y) = \left(\frac{a_x}{|\vec{a}|}; \frac{a_y}{|\vec{a}|} \right),$$

длина которого равна единице.

Учитывая, что $|\vec{a}| = \sqrt{12^2 + (-5)^2} = \sqrt{144 + 25} = 13$, получим

$$\vec{e} = (e_x; e_y) = \left(\frac{12}{13}; -\frac{5}{13} \right).$$

Тогда производная функции $z(x, y) = y^3 + x^2y - xy^2 - 5x - 4y$ в точке $M(-1; 2)$ в направлении вектора $\vec{e} = \left(\frac{12}{13}; -\frac{5}{13} \right)$ равна

$$z'_{\vec{e}} \Big|_{(-1; 2)} = z'_x \Big|_{(-1; 2)} \cdot e_x + z'_y \Big|_{(-1; 2)} \cdot e_y = -13 \cdot \frac{12}{13} + 13 \cdot \left(-\frac{5}{13} \right) = -17.$$

Ответ: $z'_{\vec{e}} \Big|_{(-1; 2)} = -17$.

№5. Исследовать функцию $z(x, y) = 2x^3 - 12xy + 3y^2 - 18x - 6y + 3$ на экстремум.

Решение

Экстремумы функции

$$z(x, y) = 2x^3 - 12xy + 3y^2 - 18x - 6y + 3$$

должны удовлетворять системе

$$\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases}.$$

Тогда, вычисляя частные производные функции первого порядка:

$$\begin{aligned} z'_x &= (2x^3 - 12xy + 3y^2 - 18x - 6y + 3)'_x = 2(x^3)'_x - 12(x)'_x y + 0 - 18(x)'_x - 0 + 0 = \\ &= 2 \cdot 3x^2 - 12 \cdot 1 \cdot y - 18 \cdot 1 = 6x^2 - 12y - 18, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z'_y &= (2x^3 - 12xy + 3y^2 - 18x - 6y + 3)'_y = 0 - 12x(y)'_y + 3(y^2)'_y - 0 - 6(y)'_y + 0 = \\ &= -12x \cdot 1 + 3 \cdot 2y - 6 \cdot 1 = -12x + 6y - 6, \end{aligned}$$

приходим к системе $\begin{cases} 6x^2 - 12y - 18 = 0, \\ -12x + 6y - 6 = 0, \end{cases}$ или $\begin{cases} x^2 - 2y - 3 = 0, \\ -2x + y - 1 = 0. \end{cases}$

Решая последнюю систему методом подстановки, получим

$$\begin{cases} x^2 - 2(2x + 1) - 3 = 0, \\ y = 2x + 1, \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x^2 - 4x - 5 = 0, \\ y = 2x + 1. \end{cases}$$

Откуда

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot (-5)}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 20}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{36}}{2} = \frac{4 \pm 6}{2}.$$

Следовательно, $\begin{cases} x = \frac{4-6}{2} = -1, \\ y = 2 \cdot (-1) + 1 = -1, \end{cases}$ или $\begin{cases} x = \frac{4+6}{2} = 5, \\ y = 2 \cdot 5 + 1 = 11. \end{cases}$

Таким образом, точки $M_1(-1; -1)$ и $M_2(5; 11)$ – критические точки функции.

Вычислим частные производные второго порядка функции $z(x, y)$:

$$z''_{xx} = (z'_x)'_x = (6x^2 - 12y - 18)'_x = 6(x^2)'_x - 0 - 0 = 6 \cdot 2x = 12x,$$

$$z''_{xy} = (z'_x)'_y = (6x^2 - 12y - 18)'_y = 0 - 12(y)'_y - 0 = -12 \cdot 1 = -12,$$

$$z''_{yx} = (z'_y)'_x = (-12x + 6y - 6)'_x = -12(x)'_x + 0 - 0 = -12 \cdot 1 = -12,$$

$$z''_{yy} = (z'_y)'_y = (-12x + 6y - 6)'_y = 0 + 6(y)'_y - 0 = 6 \cdot 1 = 6.$$

Заметим, что для смешанных частных производных второго порядка z''_{xy} , z''_{yx} выполняется соотношение $z''_{xy} = z''_{yx}$.

Вычислим определитель:

$$\Delta = \begin{vmatrix} z''_{xx} & z''_{xy} \\ z''_{yx} & z''_{yy} \end{vmatrix} = z''_{xx} \cdot z''_{yy} - z''_{xy} \cdot z''_{yx} = 12x \cdot 6 - (-12) \cdot (-12) = 72x - 144.$$

Тогда в точке $M_1(-1; -1)$ определитель равен

$$\Delta(M_1) = 72 \cdot (-1) - 144 = -216 < 0,$$

а в точке $M_2(5; 11)$:

$$\Delta(M_2) = 72 \cdot 5 - 144 = 360 - 144 = 216 > 0.$$

Так как $\Delta(M_2) > 0$, то в точке M_2 функция достигает экстремума.

Учитывая, что $z''_{xx}(M_2) = z''_{xx}(5; 11) = 12x|_{M_2} = 12 \cdot 5 = 60 > 0$, то в точке M_2 функция имеет минимум.

Заметим, что если в критической точке M выполняется $\Delta(M) > 0$ и $z''_{xx}(M) < 0$, то в этой точке функция имеет максимум.

Вычислим значение функции в точке $M_2(5; 11)$:

$$\begin{aligned} z(M_2) &= z(5; 11) = 2x^3 - 12xy + 3y^2 - 18x - 6y + 3|_{M_2} = \\ &= 2 \cdot 5^3 - 12 \cdot 5 \cdot 11 + 3 \cdot 11^2 - 18 \cdot 5 - 6 \cdot 11 + 3 = 250 - 660 + 363 - 90 - 66 + 3 = -200. \end{aligned}$$

Ответ: $z_{\min}(x; y) = z(5; 11) = -200$.

№6. Используя метод наименьших квадратов, найти линейную зависимость между x и y по данным, приведенным в таблице. Сделать чертеж.

Решение

Исходные данные представлены в таблице:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
y_i	-10	-9	-5	-5	-2	-9	2	3	6	9

Параметры (a) и (b) линейной зависимости $y = ax + b$ определим, решая систему уравнений:

$$\begin{cases} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \cdot a + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \cdot b = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \\ \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \cdot a + n \cdot b = \sum_{i=1}^n y_i. \end{cases}$$

Составим расчетную таблицу:

i	x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$
1	-4	-10	16	40
2	-3	-9	9	27
3	-2	-5	4	10
4	-1	-5	1	5
5	0	-2	0	0
6	1	-9	1	-9
7	2	2	4	4
8	3	3	9	9
9	4	6	16	24
10	5	9	25	45
Σ	5	-20	85	155

Тогда

$$n = 10, \quad \sum_{i=1}^n x_i^2 = 85, \quad \sum_{i=1}^n x_i = 5, \quad \sum_{i=1}^n x_i y_i = 155, \quad \sum_{i=1}^n y_i = -20.$$

Решаем систему

$$\begin{cases} 85a + 5b = 155, \\ 5a + 10b = -20, \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 17a + b = 31, \\ a + 2b = -4, \end{cases}$$

используя, например, правило Крамера:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 17 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 17 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 34 - 1 = 33,$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 31 & 1 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} = 31 \cdot 2 - 1 \cdot (-4) = 62 + 4 = 66,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 17 & 31 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = 17 \cdot (-4) - 31 \cdot 1 = -68 - 31 = -99.$$


Тогда

$$a = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{66}{33} = 2,$$

$$b = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-99}{33} = -3.$$

Следовательно, уравнение $y = 2x - 3$ определяет линейную зависимость между x и y .

В системе координат изображаем точки (x_i, y_i) и прямую $y = 2x - 3$ (см. рис.).



VI Решение практических заданий по теме: «Интегральное исчисление»

№1. Найти неопределенные интегралы:

а) $\int e^{3-4x} dx$; б) $\int \frac{dx}{36-25x^2}$; в) $\int \frac{xdx}{3-5x^2}$; г) $\int \frac{e^{2x} dx}{3-e^{2x}}$.

Решение

а) Учитывая, что

$$d(3 - 4x) = (3 - 4x)' dx = (0 - 4 \cdot 1) dx = -4 dx \text{ или } dx = -\frac{1}{4} d(3 - 4x),$$

получим

$$\int e^{3-4x} dx = \int e^{3-4x} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) d(3 - 4x) = -\frac{1}{4} \int e^{3-4x} d(3 - 4x) = -\frac{1}{4} \cdot e^{3-4x} + C.$$

Ответ: $-\frac{1}{4} \cdot e^{3-4x} + C.$

б) Вычисления основаны на использовании одного из табличных интегралов:

1. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C, a \neq 0;$

2. $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C, a \neq 0;$

3. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, a \neq 0;$

4. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + b}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 + b} \right| + C, b \neq 0.$

Так, например:

1.
$$\int \frac{dx}{36 - 25x^2} = \int \frac{dx}{-25 \left(x^2 - \frac{36}{25} \right)} = -\frac{1}{25} \int \frac{dx}{x^2 - \left(\frac{6}{5} \right)^2} = -\frac{1}{25} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{6}{5}} \ln \left| \frac{x - \frac{6}{5}}{x + \frac{6}{5}} \right| + C =$$
$$= -\frac{1}{60} \ln \left| \frac{5x - 6}{5x + 6} \right| + C;$$

2.
$$\int \frac{dx}{36 + 25x^2} = \int \frac{dx}{25 \left(\frac{36}{25} + x^2 \right)} = \frac{1}{25} \int \frac{dx}{\left(\frac{6}{5} \right)^2 + x^2} = \frac{1}{25} \cdot \frac{1}{\frac{6}{5}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\frac{6}{5}} + C =$$
$$= \frac{1}{25} \cdot \frac{5}{6} \operatorname{arctg} \frac{5x}{6} + C = \frac{1}{30} \operatorname{arctg} \frac{5x}{6} + C;$$

3.
$$\int \frac{dx}{\sqrt{36 - 25x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{25 \left(\frac{36}{25} - x^2 \right)}} = \frac{1}{5} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{6}{5} \right)^2 - x^2}} = \frac{1}{5} \arcsin \frac{x}{\frac{6}{5}} + C =$$
$$= \frac{1}{5} \arcsin \frac{5x}{6} + C;$$

4.
$$\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 \pm 36}} = \int \frac{dx}{\sqrt{25 \left(x^2 \pm \frac{36}{25} \right)}} = \frac{1}{5} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm \frac{36}{25}}} = \frac{1}{5} \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm \frac{36}{25}} \right| + C_1 =$$
$$= \frac{1}{5} \ln \left| 5x + \sqrt{25x^2 \pm 36} \right| + C.$$

в) Используем метод подстановки (замены переменной).

$$\int \frac{x dx}{3-5x^2} = \left. \begin{array}{l} t = 3-5x^2 \\ dt = d(3-5x^2) = (3-5x^2)' dx = -10x dx \\ x dx = -\frac{1}{10} dt \end{array} \right| = \int \frac{-\frac{1}{10} dt}{t} = -\frac{1}{10} \int \frac{dt}{t} =$$

$$= -\frac{1}{10} \ln|t| + C = -\frac{1}{10} \ln|3-5x^2| + C.$$

Ответ: $-\frac{1}{10} \ln|3-5x^2| + C.$

г) Используем метод подстановки (замены переменной).

$$\int \frac{e^{2x} dx}{3-e^{2x}} = \left. \begin{array}{l} t = 3-e^{2x} \\ dt = d(3-e^{2x}) = (3-e^{2x})' dx = -2e^{2x} dx \\ e^{2x} dx = -\frac{1}{2} dt \end{array} \right| = \int \frac{-\frac{1}{2} dt}{t} = -\frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} =$$

$$= -\frac{1}{2} \ln|t| + C = -\frac{1}{2} \ln|3-e^{2x}| + C.$$

Ответ: $-\frac{1}{2} \ln|3-e^{2x}| + C.$

№2. Найти неопределенные интегралы:

а) $\int \frac{x}{\sqrt{7x-2}} dx$; б) $\int x\sqrt{8x+3} dx.$

Решение

Используем метод подстановки (замены переменной).

а)

$$\int \frac{x}{\sqrt{7x-2}} dx = \left. \begin{array}{l} \sqrt{7x-2} = t, \quad 7x-2 = t^2, \\ 7x = t^2 + 2, \quad x = \frac{t^2+2}{7}, \\ dx = d\left(\frac{t^2+2}{7}\right) = \frac{2t}{7} dt \end{array} \right| = \int \frac{t^2+2}{7} \cdot \frac{1}{t} \cdot \frac{2t}{7} dt = \frac{2}{7^2} \int (t^2+2) dt =$$

$$= \frac{2}{49} \left(\frac{t^3}{3} + 2t \right) + C = \frac{2}{3 \cdot 49} t^3 + \frac{4}{49} t + C = \frac{2}{147} (\sqrt{7x-2})^3 + \frac{4}{49} \sqrt{7x-2} + C.$$

$$\begin{aligned}
 \text{б) } \int x \sqrt{8x+3} dx &= \left| \begin{array}{l} \sqrt{8x+3} = t, \quad 8x+3 = t^2, \\ 8x = t^2 - 3, \quad x = \frac{t^2 - 3}{8}, \\ dx = d\left(\frac{t^2 - 3}{8}\right) = \frac{2t}{8} dt = \frac{t}{4} dt \end{array} \right| = \int \frac{t^2 - 3}{8} \cdot t \cdot \frac{t}{4} dt = \\
 &= \frac{1}{32} \int (t^2 - 3)t^2 dt = \frac{1}{32} \int (t^4 - 3t^2) dt = \frac{1}{32} \int t^4 dt - \frac{3}{32} \int t^2 dt = \\
 &= \frac{1}{32} \cdot \frac{t^5}{5} - \frac{3}{32} \cdot \frac{t^3}{3} + C = \frac{1}{160} (\sqrt{8x+3})^5 - \frac{1}{32} (\sqrt{8x+3})^3 + C.
 \end{aligned}$$

№3. Найти неопределенный интеграл:

$$\int x e^{-3x} dx.$$

Решение

Заметим, что $d(e^{-3x}) = (e^{-3x}) dx = -3e^{-3x} dx$. Откуда $e^{-3x} dx = -\frac{1}{3} d(e^{-3x})$.

$$\text{Тогда } \int x e^{-3x} dx = \int x \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) d(e^{-3x}) = -\frac{1}{3} \int x d(e^{-3x}).$$

Далее, используя формулу интегрирования по частям $\int v du = vu - \int u dv$, где $v = x$, а $u = e^{-3x}$, получим

$$-\frac{1}{3} \int x d(e^{-3x}) = -\frac{1}{3} \cdot \left(x e^{-3x} - \int e^{-3x} dx\right) = -\frac{1}{3} x e^{-3x} + \frac{1}{3} \int e^{-3x} dx.$$

Учитывая, что $e^{-3x} dx = -\frac{1}{3} d(e^{-3x})$, имеем

$$\int e^{-3x} dx = -\frac{1}{3} \int d(e^{-3x}) = -\frac{1}{3} e^{-3x} + C_1.$$

Таким образом,

$$\int x e^{-3x} dx = -\frac{1}{3} x e^{-3x} + \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{1}{3} e^{-3x}\right) + C = -\frac{1}{3} x e^{-3x} - \frac{1}{9} e^{-3x} + C.$$

Ответ: $-\frac{1}{3} x e^{-3x} - \frac{1}{9} e^{-3x} + C.$

№4. Найти неопределенный интеграл

$$\int \frac{3x+2}{x^2-8x+20} dx.$$

Решение

Вычисляем интеграл от простейшей рациональной дроби вида

$$\frac{Mx + N}{x^2 + px + q},$$

где $\frac{p^2}{4} - q < 0$ и знаменатель дроби представляется в виде

$$x^2 + px + q = x^2 + 2x \cdot \frac{p}{2} + \left(\frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{2}\right)^2 + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \left(\frac{p}{2}\right)^2.$$

$$\begin{aligned} \int \frac{3x+2}{x^2-8x+25} dx &= \int \frac{3x+2}{x^2-2 \cdot x \cdot 4+4^2-4^2+25} dx = \\ &= \int \frac{3x+2}{(x^2-2 \cdot x \cdot 4+4^2)-16+25} dx = \int \frac{3x+2}{(x-4)^2+9} dx = \int \frac{3(x-4+4)+2}{(x-4)^2+9} dx = \\ &= \int \frac{3(x-4)+12+2}{(x-4)^2+9} dx = \int \frac{3(x-4)+14}{(x-4)^2+9} dx = \int \left(\frac{3(x-4)}{(x-4)^2+9} + \frac{14}{(x-4)^2+9} \right) dx = \\ &= \int \frac{3(x-4)}{(x-4)^2+9} dx + \int \frac{14}{(x-4)^2+9} dx = 3 \int \frac{(x-4) dx}{(x-4)^2+9} + 14 \int \frac{dx}{(x-4)^2+9} = \\ &= \frac{3}{2} \int \frac{2(x-4) dx}{(x-4)^2+9} + 14 \int \frac{dx}{(x-4)^2+3^2} = \frac{3}{2} \int \frac{d(x-4)^2}{(x-4)^2+9} + 14 \int \frac{dx}{(x-4)^2+3^2} = \\ &= \frac{3}{2} \int \frac{d((x-4)^2+9)}{(x-4)^2+9} + 14 \int \frac{d(x-4)}{(x-4)^2+3^2}. \end{aligned}$$

Учитывая, что $\int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C$ и $\int \frac{dt}{a^2+t^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{t}{a} + C$, получим

$$\begin{aligned} \int \frac{3x+2}{x^2-8x+25} dx &= \frac{3}{2} \ln|(x-4)^2+9| + 14 \cdot \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{x-4}{3} + C = \\ &= \frac{3}{2} \ln(x^2-8x+25) + \frac{14}{3} \operatorname{arctg} \frac{x-4}{3} + C. \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{3}{2} \ln(x^2-8x+25) + \frac{14}{3} \operatorname{arctg} \frac{x-4}{3} + C.$

№5. Найти неопределенный интеграл

$$\int \frac{3x^2-17x+2}{(x-1)(x+2)(x+3)} dx.$$

Решение

Представим подынтегральную функцию в виде суммы простейших дробей:

$$\frac{3x^2 - 17x + 2}{(x-1)(x+2)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+3}.$$

Приведём правую часть последнего равенства к общему знаменателю и, приравняв числители дробей, получим тождество:

$$3x^2 - 17x + 2 = A(x+2)(x+3) + B(x-1)(x+3) + C(x-1)(x+2).$$

Найдём коэффициенты А, В, С.

При $x = -3$ коэффициенты А и В в правой части последнего равенства обращаются в нуль. Получаем:

$$3 \cdot (-3)^2 - 17 \cdot (-3) + 2 = C(-3-1)(-3+2) \Rightarrow 80 = 4C \Rightarrow C = 20.$$

При $x = -2$ коэффициенты А и С в правой части равенства обращаются в нуль. Получаем:

$$3 \cdot (-2)^2 - 17 \cdot (-2) + 2 = B(-2-1)(-2+3) \Rightarrow 48 = -3B \Rightarrow B = -16.$$

При $x = 1$ коэффициенты В и С в правой части равенства обращаются в нуль. Получаем:


$$3 \cdot 1^2 - 17 \cdot 1 + 2 = A(1+2)(1+3) \Rightarrow -12 = 12A \Rightarrow A = -1.$$

Подставив найденные коэффициенты в разложение подынтегральной функции на простейшие дроби, получим:

$$\int \frac{3x^2 - 17x + 2}{(x-1)(x+2)(x+3)} dx = \int \left(\frac{-1}{x-1} + \frac{-16}{x+2} + \frac{20}{x+3} \right) dx = -\int \frac{dx}{x-1} - 16 \int \frac{dx}{x+2} + 20 \int \frac{dx}{x+3} = -\ln|x-1| - 16 \ln|x+2| + 20 \ln|x+3| + C = \ln \frac{(x+3)^{20}}{(x-1)(x+2)^{16}} + C.$$

Ответ: $\ln \frac{(x+3)^{20}}{(x-1)(x+2)^{16}} + C.$

№6. Найти площадь фигуры, ограниченной параболой $f(x) = -x^2 + 2x + 5$ и прямой $g(x) = -x + 1$



Решение

Строим графики функций $f(x)$ и $g(x)$.

Для нахождения точек пересечения графиков функций $f(x)$ и $g(x)$, решаем уравнение $f(x) = g(x)$, т.е.

$$-x^2 + 2x + 5 = -x + 1.$$

Откуда

$$x^2 - 3x - 4 = 0.$$

Корнями уравнения являются значения:

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot (-4)}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{3 \pm 5}{2},$$

т.е. $x_1 = \frac{3-5}{2} = -1$ и $x_2 = \frac{3+5}{2} = 4$.

Значения функций $f(x)$ и $g(x)$ в этих точках $f(-1) = g(-1) = 2$ и $f(4) = g(4) = -3$. Таким образом $(-1; 2)$ и $(4; -3)$ – точки пересечения графиков функций.

Площадь фигуры определяем по формуле: $S = \int_{x_1}^{x_2} (f(x) - g(x)) dx$, где x_1

и x_2 – решения уравнения $f(x) = g(x)$.

Тогда

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^4 (f(x) - g(x)) dx = \int_{-1}^4 (-x^2 + 2x + 5 - (-x + 1)) dx = \int_{-1}^4 (-x^2 + 2x + 5 + x - 1) dx = \\ &= \int_{-1}^4 (-x^2 + 3x + 4) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + 3 \cdot \frac{x^2}{2} + 4x \right) \Big|_{-1}^4 = \\ &= \left(-\frac{4^3}{3} + 3 \cdot \frac{4^2}{2} + 4 \cdot 4 \right) - \left(-\frac{(-1)^3}{3} + 3 \cdot \frac{(-1)^2}{2} + 4 \cdot (-1) \right) = \\ &= \left(-\frac{64}{3} + 24 + 16 \right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{2} - 4 \right) = -\frac{64}{3} + 40 - \frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 4 = 44 - \frac{65}{3} - \frac{3}{2} = \\ &= 44 - 21\frac{2}{3} - 1\frac{1}{2} = 22 - \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = 22 - \frac{7}{6} = 20\frac{5}{6}. \end{aligned}$$

Ответ: $20\frac{5}{6}$.

VII Решение практических заданий по теме: «Дифференциальные уравнения»

№1. Найти общее решение дифференциального уравнения:

а) $\sin^2 3x \cdot dy + 3y dx = 0$.

Решение

Исходное уравнение является дифференциальным уравнением первого порядка с разделяющимися переменными.

Заметим, что $y = 0$ является одним из решений исходного дифференциального уравнения.

Разделяя переменные, имеем

$$\frac{dy}{y} = -\frac{3dx}{\sin^2 3x} \quad \text{или} \quad \frac{dy}{y} = -\frac{d(3x)}{\sin^2 3x}.$$

Интегрируя последнее уравнение, получим

$$\int \frac{dy}{y} = -\int \frac{d(3x)}{\sin^2 3x} + C \text{ или } \ln|y| = \operatorname{ctg} 3x + C.$$

Откуда, $|y| = e^{\operatorname{ctg} 3x + C}$ или $y = \pm e^C \cdot e^{\operatorname{ctg} 3x}$. Тогда, полагая $C_1 = \pm e^C$ ($C_1 \neq 0$) и учитывая, что $y = 0$ также является решением исходного уравнения, получим $y = C_1 e^{\operatorname{ctg} 3x}$ ($C_1 \in \mathbb{R}$) – общее решение уравнения $\sin^2 3x \cdot dy + 3y dx = 0$.

Ответ: $y = C_1 e^{\operatorname{ctg} 3x}$, ($C_1 \in \mathbb{R}$).

$$\text{б) } (3x^2 + 2)y' - 6yx = 0.$$

Решение

Исходное уравнение является дифференциальным уравнением первого порядка с разделяющимися переменными.

Учитывая, что $y' = \frac{dy}{dx}$, получим уравнение

$$(3x^2 + 2) \frac{dy}{dx} - 6yx = 0 \text{ или } (3x^2 + 2) dy = 6yx dx.$$

Заметим, что $y = 0$ является одним из решений исходного дифференциального уравнения.

Разделяя переменные, имеем

$$\frac{dy}{y} = \frac{6x dx}{3x^2 + 2}.$$

Интегрируя последнее уравнение, получим

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{6x}{3x^2 + 2} dx + C.$$

Учитывая, что

$$d(3x^2 + 2) = (3x^2 + 2)' dx = (6x + 0) dx = 6x dx,$$

имеем

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{d(3x^2 + 2)}{3x^2 + 2} + C.$$

Откуда, полагая $C = \ln C_1$ ($C_1 > 0$), получим

$$\ln|y| = \ln|3x^2 + 2| + \ln C_1.$$

Используя свойства логарифмов, приходим к уравнению

$$\ln|y| = \ln C_1 |3x^2 + 2|.$$

Откуда

$$|y| = C_1 |3x^2 + 2| \text{ или } y = \pm C_1 (3x^2 + 2).$$

Тогда, полагая $C_2 = \pm C_1$ ($C_2 \neq 0$) и учитывая, что $y = 0$ также является решением исходного уравнения, получим

$$y = C_2 (3x^2 + 2), \quad (C_2 \in \mathbb{R}),$$

общее решение уравнения $(3x^2 + 2)y' - 6yx = 0$.

Ответ: $y = C_2(3x^2 + 2)$.

№2. Найти частное решение дифференциального уравнения:

$$y' - \frac{6}{x}y = 2e^{2x+2}x^6, \quad y(-1) = 3.$$

Решение

Исходное уравнение является линейным неоднородным дифференциальным уравнением первого порядка вида: $y' + p(x)y = q(x)$. Найдем общее решение дифференциального уравнения методом Бернулли.

Решение уравнения будем искать в виде: $y = uv$. Так как $y' = u'v + uv'$, то, подставляя y и y' в исходное уравнение, получим

$$(u'v + uv') - \frac{6}{x}uv = 2e^{2x+2}x^6.$$

Группируя второе и третье слагаемое в левой части последнего уравнения, имеем

$$u'v + u\left(v' - \frac{6}{x}v\right) = 2e^{2x+2}x^6.$$

Найдем одно из ненулевых решений уравнения $v' - \frac{6}{x}v = 0$ или $v' = \frac{6}{x}v$, которое является уравнением с разделяющимися переменными. Учитывая, что $v' = \frac{dv}{dx}$, имеем $\frac{dv}{dx} = \frac{6}{x}v$ и, разделяя переменные, получим

$$\frac{dv}{v} = \frac{6dx}{x}.$$

Интегрируя последнее уравнение, имеем $\int \frac{dv}{v} = 6 \int \frac{dx}{x} + C$. Откуда, полагая $C = \ln C_1$ ($C_1 > 0$), получим $\ln|v| = 6\ln|x| + \ln C_1$ и, используя свойства логарифмов, приходим к уравнению $\ln|v| = \ln|x|^6 + \ln C_1$ или $\ln|v| = \ln C_1 |x|^6$. Откуда $|v| = C_1 |x|^6$ или $v = \pm C_1 x^6$.

Тогда, полагая $C_2 = \pm C_1$ ($C_2 \neq 0$) и учитывая, что $v = 0$ также является решением уравнения $v' - \frac{6}{x}v = 0$, получим $v = C_2 x^6$ ($C_2 \in \mathbb{R}$) – общее решение уравнения $v' - \frac{6}{x}v = 0$.

В качестве одного из ненулевых решений возьмем например $v = x^6$, полагая $C_2 = 1$.

Учитывая, что $v' - \frac{6}{x}v = 0$ и подставляя $v = x^6$ в уравнение

$$u'v + u\left(v' - \frac{6}{x}v\right) = 2e^{2x+2}x^6,$$

получим $u' \cdot x^6 = 2e^{2x+2}x^6$ или $u' = 2e^{2x+2}$ – неполное дифференциальное уравнение первого порядка вида: $u' = f(x)$.

Откуда

$$u = \int 2e^{2x+2} dx + C.$$

Учитывая $d(2x + 2) = (2x + 2)'dx = 2dx$, имеем

$$u = \int e^{2x+2} d(2x + 2) + C = e^{2x+2} + C.$$

Таким образом, $y = uv = (e^{2x+2} + C)x^6$ – общее решение дифференциального уравнения.

Найдем частное решение, удовлетворяющее начальному условию $y(-1) = 3$. Подставляя, $x = -1$ и $y = 3$ в уравнение $y = (e^{2x+2} + C)x^6$, получим: $3 = (e^{2(-1)+2} + C)(-1)^6$ или $3 = 1 + C$ и $C = 2$.

Следовательно, $y = (e^{2x+2} + 2)x^6$ – частное решение исходного дифференциального уравнения, удовлетворяющее начальному условию $y(-1) = 3$.

Ответ: $y = (e^{2x+2} + 2)x^6$.

№3. Найти общее решение дифференциального уравнения:

а) $y'' - 2y' - 35y = 0$; б) $y'' + 12y' + 36y = 0$; в) $y'' + 6y' + 25y = 0$.

Решение.

а) Решим характеристическое уравнение $\lambda^2 - 2\lambda - 35 = 0$, производя в уравнении $y'' - 2y' - 35y = 0$ замену $y'' = \lambda^2$, $y' = \lambda^1 = \lambda$ и $y = \lambda^0 = 1$.

Тогда

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-35)}}{2 \cdot 1} = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 140}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{144}}{2} = \frac{2 \pm 12}{2}.$$

Откуда

$$\lambda_1 = \frac{2 - 12}{2} = \frac{-10}{2} = -5 \text{ и } \lambda_2 = \frac{2 + 12}{2} = \frac{14}{2} = 7.$$

Если характеристическое уравнение имеет два различных действительных корня λ_1 и λ_2 , то общее решение соответствующего однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами имеет вид

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}.$$

Следовательно, $y = C_1 e^{-5x} + C_2 e^{7x}$ – общее решение исходного уравнения.

Ответ: $y = C_1 e^{-5x} + C_2 e^{7x}$.

б) Решим характеристическое уравнение $\lambda^2 + 12\lambda + 36 = 0$, производя в уравнении $y'' + 12y' + 36y = 0$ замену $y'' = \lambda^2$, $y' = \lambda^1 = \lambda$ и $y = \lambda^0 = 1$.

Тогда

$$\lambda_{1,2} = \frac{-12 \pm \sqrt{12^2 - 4 \cdot 1 \cdot 36}}{2 \cdot 1} = \frac{-12 \pm \sqrt{144 - 144}}{2} = \frac{-12 \pm \sqrt{0}}{2} = \frac{-12 \pm 0}{2}.$$

Откуда $\lambda_1 = \lambda_2 = -6$.

Если характеристическое уравнение имеет два равных действительных корня $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ (кратный корень), то общее решение соответствующего однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами имеет вид

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}.$$

Следовательно, $y = (C_1 + C_2 x) e^{-6x}$ – общее решение исходного уравнения.

Ответ: $y = (C_1 + C_2 x) e^{-6x}$.

в) Решим характеристическое уравнение $\lambda^2 + 6\lambda + 25 = 0$, производя в уравнении $y'' + 6y' + 25y = 0$ замену $y'' = \lambda^2$, $y' = \lambda^1 = \lambda$ и $y = \lambda^0 = 1$.

Тогда

$$\lambda_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25}}{2 \cdot 1} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 100}}{2} = \frac{-6 \pm \sqrt{-64}}{2} = \frac{-6 \pm 8i}{2} = -3 \pm 4i.$$

Откуда $\lambda_1 = -3 - 4i$ и $\lambda_2 = -3 + 4i$, т.е. корни характеристического уравнения имеют вид $\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$, где $\alpha = -3$, $\beta = 4$.

Если характеристическое уравнение имеет два сопряженных комплексных корня $\lambda_1 = \alpha - \beta i$ и $\lambda_2 = \alpha + \beta i$, то общее решение соответствующего однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами имеет вид

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \sin \beta x + C_2 \cos \beta x).$$

Следовательно, $y = e^{-3x} (C_1 \sin 4x + C_2 \cos 4x)$ – общее решение исходного уравнения.

Ответ: $y = e^{-3x}(C_1 \sin 4x + C_2 \cos 4x)$.

№4. Найти общее решение дифференциального уравнения:

$$y'' + 3y' - 4y = -4x^2 - 6x + 19.$$

Решение

Исходное уравнение является неоднородным дифференциальным уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами и правой частью вида: $P_n(x)e^{\alpha x}$, где $\alpha = 0$, $P_n(x) = -4x^2 - 6x + 19$ – многочлен степени $n = 2$.

Общее решение дифференциального уравнения имеет вид: $y = y_0 + y_1$, где y_0 – общее решение однородного дифференциального уравнения $y'' + 3y' - 4y = 0$, а y_1 – частное решение неоднородного дифференциального уравнения.

Решим характеристическое уравнение $\lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0$, производя в уравнении $y'' + 3y' - 4y = 0$ замену $y'' = \lambda^2$, $y' = \lambda^1 = \lambda$ и $y = \lambda^0 = 1$.

Тогда

$$\lambda_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)}}{2 \cdot 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 16}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{-3 \pm 5}{2}.$$

$$\text{Откуда } \lambda_1 = \frac{-3 - 5}{2} = \frac{-8}{2} = -4 \text{ и } \lambda_2 = \frac{-3 + 5}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

Если характеристическое уравнение имеет два различных действительных корня λ_1 и λ_2 , то общее решение соответствующего однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами имеет вид

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}.$$

Следовательно, $y_0 = C_1 e^{-4x} + C_2 e^x$ – общее решение однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами $y'' + 3y' - 4y = 0$.

Найдем частное решение исходного дифференциального уравнения, которое будем отыскивать в виде: $y_1 = Ax^2 + Bx + C$, так как $\alpha = 0$ не является корнем характеристического уравнения. Так как $y_1' = 2Ax + B$ и $y_1'' = 2A$, то, подставляя y_1'' , y_1' , y_1 в исходное уравнение, получим:

$$2A + 3(2Ax + B) - 4(Ax^2 + Bx + C) = -4x^2 - 6x + 19$$

или

$$-4Ax^2 + (6A - 4B)x + (2A + 3B - 4C) = -4x^2 - 6x + 19.$$

Откуда

$$\begin{cases} -4A = -4, \\ 6A - 4B = -6, \\ 2A + 3B - 4C = 19, \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} A = 1, \\ B = 3, \\ C = -2. \end{cases}$$

Следовательно,

$$y_1 = Ax^2 + Bx + C = x^2 + 3x - 2$$

– частное решение исходного дифференциального уравнения.

Таким образом,

$$y = y_0 + y_1 = C_1 e^{-4x} + C_2 e^x + x^2 + 3x - 2$$

– общее решение дифференциального уравнения.

Ответ: $y = C_1 e^{-4x} + C_2 e^x + x^2 + 3x - 2$.

№5. Найти общее решение дифференциального уравнения:

$$y'' + 10y' + 25y = 6e^{-5x}.$$

Решение

Исходное уравнение является неоднородным дифференциальным уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами и правой частью вида: $P_n(x)e^{\alpha x}$, где $\alpha = -5$, $P_n(x) = 6$ – многочлен степени $n = 0$.

Общее решение дифференциального уравнения имеет вид: $y = y_0 + y_1$, где y_0 – общее решение однородного дифференциального уравнения $y'' + 10y' + 25y = 0$, а y_1 – общее решение неоднородного дифференциального уравнения.

Решим характеристическое уравнение $\lambda^2 + 10\lambda + 25 = 0$, производя в уравнении $y'' + 10y' + 25y = 0$ замену $y'' = \lambda^2$, $y' = \lambda^1 = \lambda$ и $y = \lambda^0 = 1$.

Тогда

$$\lambda_{1,2} = \frac{-10 \pm \sqrt{10^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25}}{2 \cdot 1} = \frac{-10 \pm \sqrt{100 - 100}}{2} = \frac{-10 \pm \sqrt{0}}{2} = \frac{-10 \pm 0}{2}.$$

Откуда $\lambda_1 = \lambda_2 = -5$.

Если характеристическое уравнение имеет два равных действительных корня $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ (кратный корень), то общее решение соответствующего однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами имеет вид

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}.$$

Следовательно, $y = (C_1 + C_2 x) e^{-5x}$ – общее решение однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами $y'' + 10y' + 25y = 0$.

Заметим, что если характеристическое уравнение имеет два различных действительных корня λ_1 и λ_2 , то общее решение соответствующего однородного дифференциального уравнения

второго порядка с постоянными коэффициентами имеет вид

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}.$$

Найдем частное решение исходного дифференциального уравнения, которое будем искать в виде: $y_1 = A e^{-5x} \cdot x^2 = A x^2 e^{-5x}$, так как $\alpha = -5$ является кратным корнем характеристического уравнения.

Заметим, что если α является одним из действительных корней характеристического уравнения, то частное решение исходного дифференциального уравнения имеет вид:

$$y_1 = A e^{\alpha x} \cdot x^1 = A x e^{\alpha x}.$$

Так как

$$y_1' = A(x^2)' e^{-5x} + A x^2 (e^{-5x})' = A(2x) \cdot e^{-5x} + A x^2 \cdot (-5e^{-5x}) = A(2x - 5x^2) \cdot e^{-5x}$$

и

$$\begin{aligned} y_1'' &= A(2x - 5x^2)' e^{-5x} + A(2x - 5x^2)(e^{-5x})' = A(2 - 10x) e^{-5x} + A(2x - 5x^2)(-5e^{-5x}) = \\ &= A(2 - 10x) e^{-5x} + A(-10x + 25x^2) e^{-5x} = A(2 - 20x + 25x^2) e^{-5x}, \end{aligned}$$

то, подставляя y_1'' , y_1' , y_1 в исходное уравнение $y'' + 10y' + 25y = 6e^{-5x}$, получим:

$$A(2 - 20x + 25x^2) \cdot e^{-5x} + 10 \cdot A(2x - 5x^2) e^{-5x} + 25 A x^2 e^{-5x} = 6e^{-5x}$$

или

$$A(2 - 20x + 25x^2 + 20x - 50x^2 + 25x^2) e^{-5x} = 6e^{-5x}, \text{ т. е. } 2Ae^{-5x} = 6e^{-5x}.$$

Откуда $2A = 6$, т. е. $A = 3$.

Следовательно,

$$y_1 = A x^2 e^{-5x} = 3x^2 e^{-5x}$$

– частное решение исходного дифференциального уравнения.

Таким образом,

$$y = y_0 + y_1 = (C_1 + C_2 x) e^{-5x} + 3x^2 e^{-5x}$$

– общее решение дифференциального уравнения.

Ответ: $y = y_0 + y_1 = (C_1 + C_2 x) e^{-5x} + 3x^2 e^{-5x}$.

№6. Найти общее решение системы дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} x' = x - y, \\ y' = -4x + y. \end{cases}$$

Решение

Дифференцируем первое уравнение системы:

$$x'' = x' - y'.$$

Заменим в последнем уравнении y' его выражением из второго уравнения системы:

$$x'' = x' - (-4x + y), \quad x'' = x' + 4x - y.$$

Заменим в последнем равенстве y на выражение $y = x - x'$ из первого

уравнения системы:

$$x'' = x' + 4x - (x - x'), \quad x'' - 2x' - 3x = 0.$$

Решим последнее однородное ДУ, для чего составим характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0.$$

Его корни $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 3$ действительны и различны, поэтому общее решение запишется в виде:

$$x = C_1 e^{-t} + C_2 e^{3t}.$$

Дифференцируя это уравнение по t , получим:

$$x' = -C_1 e^{-t} + 3C_2 e^{3t}.$$

Находим y из уравнения $y = x - x'$:

$$y = C_1 e^{-t} + C_2 e^{3t} - (-C_1 e^{-t} + 3C_2 e^{3t}) = 2C_1 e^{-t} - 2C_2 e^{3t}$$

Ответ:
$$\begin{cases} x = C_1 e^{-t} + C_2 e^{3t}, \\ y = 2C_1 e^{-t} - 2C_2 e^{3t}. \end{cases}$$

VIII Решение практических заданий по теме: «Числовые и функциональные ряды»

№1. Исследовать сходимость ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+5}{n^3+3n-2}$$

Решение

Воспользуемся признаком сравнения.

Общий член исходного ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$:

$$a_n = \frac{n+5}{n^3+3n-2}.$$

Учитывая, что для больших значений n : $\frac{n+5}{n^3+3n-2} \approx \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}$, то срав-

ним исходный ряд с рядом $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, общий член которого равен $b_n = \frac{1}{n^2}$.

Вычислим предел:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+5}{n^3+3n-2} \cdot \frac{n^2}{1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3+5n^2}{n^3+3n-2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n^3}{n^3} + \frac{5n^2}{n^3}}{\frac{n^3}{n^3} + \frac{3n}{n^3} - \frac{2}{n^3}} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{5}{n}}{1 + \frac{3}{n^2} - \frac{2}{n^3}} = \frac{1 + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{n}}{1 + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n^2} - \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n^3}} = \frac{1+0}{1+0-0} = 1 \neq 0.$$

Так как значение предела не равно 0, то оба ряда являются сходящимися или расходящимися.

Заметим, что **обобщенный гармонический ряд** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$ является сходящимся, если $\alpha > 1$ и расходящимся, если $\alpha \leq 1$.

Так как ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ сходится ($\alpha = 2 > 1$), то и исходный ряд сходится.

Ответ: ряд сходится.

№2. Исследовать сходимость ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+5) \cdot 3^{2n+1}}{2^{3n-4}}.$$

Решение

Воспользуемся признаком Д'Аламбера.

Определим a_n и a_{n+1} члены ряда:

$$a_n = \frac{(n+5) \cdot 3^{2n+1}}{2^{3n-4}} \quad \text{и} \quad a_{n+1} = \frac{((n+1)+5) \cdot 3^{2(n+1)+1}}{2^{3(n+1)-4}} = \frac{(n+6) \cdot 3^{2n+3}}{2^{3n-1}}.$$

Вычислим предел:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{(n+6) \cdot 3^{2n+3}}{2^{3n-1}} \cdot \frac{2^{3n-4}}{(n+5) \cdot 3^{2n+1}} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2^{3n-4} \cdot 3^{2n+3}}{2^{3n-1} \cdot 3^{2n+1}} \cdot \frac{n+6}{n+5} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^2}{2^3} \cdot \frac{n+6}{n+5} = \frac{3^2}{2^3} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n}{n} + \frac{6}{n}}{\frac{n}{n} + \frac{5}{n}} = \frac{9}{8} \cdot \frac{1 + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6}{n}}{1 + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{n}} = \frac{9}{8} \cdot \frac{1+0}{1+0} = \frac{9}{8} > 1 \end{aligned}$$

Ряд **расходится**, так как значение предела больше 1.

Заметим, что если значение предела меньше 1, то ряд **сходится**.

Ответ: ряд расходится.

№3. Исследовать сходимость ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{11^{6n+4} (n+6)^{n^2}}{30^{6n-5} n^{n^2}}.$$

Решение

Воспользуемся признаком Коши.

$$\text{Общий член ряда } a_n = \frac{11^{6n+4} (n+6)^{n^2}}{30^{6n-5} n^{n^2}}.$$

Вычислим предел:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{11^{6n+4} (n+6)^{n^2}}{30^{6n-5} n^{n^2}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{11^{\frac{6n+4}{n}} (n+6)^{\frac{n^2}{n}}}{30^{\frac{6n-5}{n}} n^{\frac{n^2}{n}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{11^{6+\frac{4}{n}} (n+6)^n}{30^{6-\frac{5}{n}} n^n} = \\ &= \frac{11^6}{30^6} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{11^{\frac{4}{n}}}{30^{-\frac{5}{n}}} \cdot \left(\frac{n+6}{n}\right)^n = \left(\frac{11}{30}\right)^6 \cdot \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 11^{\frac{4}{n}}}{\lim_{n \rightarrow +\infty} 30^{-\frac{5}{n}}} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+6}{n}\right)^n = \\ &= \left(\frac{11}{30}\right)^6 \cdot \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 11^{\frac{4}{n}}}{\lim_{n \rightarrow +\infty} 30^{-\frac{5}{n}}} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{6}{n}\right)^{\frac{n}{6} \cdot 6} = \left(\frac{11}{30}\right)^6 \cdot \frac{11^0}{30^0} \cdot \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{6}{n}\right)^{\frac{n}{6}}\right)^6 = \\ &= \left(\frac{11}{30}\right)^6 \cdot \frac{1}{1} \cdot e^6 = \left(\frac{11e}{30}\right)^6 < 1, \text{ так как } 11e \approx 11 \cdot 2,72 = 29,92 < 30. \end{aligned}$$

Ряд **сходится**, так как значение предела меньше 1.

Заметим, что если значение предела больше 1, то ряд **расходится**.

Ответ: ряд сходится.

№4. Исследовать сходимость ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n+2}{n^2 + 4n + 136}.$$

Решение

Исходный ряд является знакочередующимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$, где

$$a_n = \frac{n+2}{n^2 + 4n + 136}.$$

Воспользуемся следствием признака Лейбница о сходимости таких рядов: **если члены знакочередующегося ряда $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$, $a_n > 0$, монотонно убывают ($a_n \geq a_{n+1}$), начиная с некоторого номе-**

ра n_0 , и стремятся к нулю ($\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$), то ряд сходится.

$$\text{Очевидно, что } a_n = \frac{n+2}{n^2+4n+136} > 0.$$

Вычислим предел:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n}{n^2} + \frac{2}{n^2}}{\frac{n^2}{n^2} + \frac{4n}{n^2} + \frac{136}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}}{1 + \frac{4}{n} + \frac{136}{n^2}} = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n^2}}{1 + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4}{n} + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{136}{n^2}} = \\ &= \frac{0+0}{1+0+0} = 0. \end{aligned}$$

Так как $a_n = \frac{n+2}{n^2+4n+136}$, то

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)+2}{(n+1)^2+4(n+1)+136} = \frac{n+3}{n^2+2n+1+4n+4+136} = \frac{n+3}{n^2+6n+141}.$$

Решим неравенство: $a_n \geq a_{n+1}$, т.е. $\frac{n+2}{n^2+4n+136} \geq \frac{n+3}{n^2+6n+141}$

$$\begin{aligned} \text{Тогда } (n+2)(n^2+6n+141) &\geq (n+3)(n^2+4n+136) \text{ и} \\ n^3+6n^2+141n+ &+ 2n^2+12n+282 \geq n^3+4n^2+136n+ \\ &+ 3n^2+12n+408. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$n^3+8n^2+153n+282 \geq n^3+7n^2+148n+408 \text{ и } n^2+5n-126 \geq 0.$$

Разложим левую часть неравенства на множители. Для этого решим уравнение $n^2+5n-126=0$, дискриминант которого равен $D=5^2-4 \cdot 1 \cdot (-126)=25+504=529=23^2$.

Откуда

$$n_1 = \frac{-5-23}{2 \cdot 1} = -14 \text{ и } n_2 = \frac{-5+23}{2 \cdot 1} = 9.$$

Таким образом, $(n-(-14))(n-9) \geq 0$ или $(n+14)(n-9) \geq 0$ и неравенство $a_n \geq a_{n+1}$ выполняется для любого натурального $n \geq n_0 = 9$.

Следовательно, исходный ряд является сходящимся.

Ответ: ряд сходится.

№5. Найти область сходимости степенного ряда:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{6^n(n+2)}.$$

Решение

Исходный ряд является степенным рядом вида $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, где

$$c_n = \frac{1}{6^n(n+2)}.$$

$$\text{Тогда } c_{n+1} = \frac{1}{6^{(n+1)}((n+1)+2)} = \frac{1}{6^{n+1}(n+3)}.$$

Вычислим **радиус сходимости** степенного ряда:

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{6^n(n+2)} \cdot \frac{6^{n+1}(n+3)}{1} \right) = 6 \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+3}{n+2} = 6 \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n}{n} + \frac{3}{n}}{\frac{n}{n} + \frac{2}{n}} = \\ &= 6 \cdot \frac{1 + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n}}{1 + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n}} = 6 \cdot \frac{1+0}{1+0} = 6. \end{aligned}$$

Следовательно, $(-R, R)$, т.е. $(-6, 6)$ – **интервал сходимости** ряда.

Если, $x = R = 6$, то получим ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{6^n(n+2)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{6^n}{6^n(n+2)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+2},$$

который расходится, как и гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

Если, $x = -R = -6$, то получим ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{6^n(n+2)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-6)^n}{6^n(n+2)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 6^n}{6^n(n+2)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+2}.$$

Полученный ряд сходится, как знакочередующийся ряд $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$,

где $a_n = \frac{1}{n+2}$. Так как $a_n = \frac{1}{n+2} > 0$, то

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+2} = 0,$$

и

$$a_0 = \frac{1}{0+2} = \frac{1}{2} > a_1 = \frac{1}{1+2} = \frac{1}{3} > a_2 = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4} > \dots$$

- монотонно убывающая последовательность.

Таким образом, $[-6, 6)$ – **область сходимости** степенного ряда.

Ответ: $[-6, 6)$.

№6. Найти разложение в степенной ряд по степеням x решения дифференциального уравнения (записать три первых, отличных от нуля, члена этого разложения):

$$y' = x - 2y^2, \quad y(0) = 0,5.$$

Решение

Решение будем искать в виде ряда:

$$y = y(x_0) + \frac{y'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{y''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{y'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \dots$$

В нашем случае $x_0 = 0$.

Имеем:

$$y(0) = 0,5,$$

$$y'(0) = 0 - 2 \cdot (0,5)^2 = -0,5,$$

$$y''(x) = (x - 2y^2)' = 1 - 4y \cdot y',$$

$$y''(0) = 1 - 4 \cdot 0,5 \cdot (-0,5) = 1 + 1 = 2.$$

Подставляя найденные значения производных в искомый ряд, получаем решение данного уравнения:

$$y = 0,5 + \frac{-0,5}{1!}x + \frac{2}{2!}x^2 + \dots = 0,5 - 0,5x + x^2 + \dots$$

Ответ: $y = 0,5 - 0,5x + x^2 + \dots$

Литература

1. Высшая математика для экономических специальностей: учебник и практикум (части I и II) / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование, 2008. – 893 с.
2. Высшая математика: Общий курс: учебник для студентов экономических специальностей вузов / Под общ. ред. проф. А.И. Яблонского. – Мн.: Выш. шк., 1993. – 349 с.
3. Гусак, А.А. Высшая математика: в 2-х частях / А.А. Гусак. – Мн.: ТетраСистемс, 2000-2001. – Ч.1. – 544 с., Ч.2. – 442 с.
4. Индивидуальные задания по высшей математике / Под ред. А.П. Рябушко, I-III ч. – Мн.: Выш. шк., 2004-2008. – Ч.1 304 с., Ч.2. – 367 с., Ч.3. – 367 с.
5. Красс, М.С. Математика для экономических специальностей: учебник / М.С. Красс. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 464 с.
6. Кузнецов, А.В. Сборник задач и упражнений по высшей математике: Общий курс: учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов / А.В. Кузнецов, Д.С. Кузнецова, Е.И. Шилкина и [др]. – Мн: Выш. шк., 1994. – 284 с.
7. Малыхин, В.И. Математика в экономике: учебник / В.И. Малыхин. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 356 с.
8. Минюк, С.А. Высшая математика: учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов / С.А. Минюк, Е.А. Ровба. – Гродно: ГрГУ, 2000. – 394 с.
9. Общий курс высшей математики для экономистов: учебник / Под ред. В.И. Ермакова. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 656 с.
10. Сборник задач по высшей математике для экономистов: учебное пособие / Под ред. В.И. Ермакова. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 575 с.

Содержание

I Практические задания по теме: «Функции нескольких переменных».....	3
II Практические задания по теме: «Интегральное исчисление».....	5
III Практические задания по теме: «Дифференциальные уравнения».....	8
IV Практические задания по теме: «Числовые и функциональные ряды».....	10
V Решение практических заданий по теме: «Функции нескольких переменных».....	12
VI Решение практических заданий по теме: «Интегральное исчисление».....	18
VII Решение практических заданий по теме: «Дифференциальные уравнения».....	24
VIII Решение практических заданий по теме: «Числовые и функциональные ряды».....	32
Литература.....	38

Учебное издание

Составители:

*Гладкий Иван Иванович
Жук Анастасия Игоревна
Махнист Леонид Петрович
Осопрелко Татьяна Николаевна
Юхимук Татьяна Юрьевна*

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА

*Методические указания и варианты
заданий по разделам:*

**Функции нескольких переменных,
Интегральное исчисление,
Дифференциальные уравнения,
Числовые и функциональные ряды**

Ответственный за выпуск: Махнист Л.П.

Редактор: Боровикова Е.А.

Компьютерная верстка: Боровикова Е.А.

Корректор: Никитчик Е.В.

Подписано в печать 23.12.2013 г. Формат 60x84 ¹/₁₆. Бумага «Снегурочка».

Усл. п. л. 2,33. Уч. изд. л. 2,5. Заказ № 1280. Тираж 100 экз.

Отпечатано на ризографе Учреждения образования
«Брестский государственный технический университет».

224017, г. Брест, ул. Московская, 267.